

IULIE 2024

CAMPANIE DE PROMOVARE A SĂNĂTĂȚII REPRODUCERII

Informează-te! Implică-te! Alege soluția potrivită pentru tine!



MINISTERUL
SĂNĂTĂȚII



Institutul
Național de
Sănătate Publică

INFECȚIILE CU TRANSMITERE SEXUALĂ – PROBLEMĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

Anual, în UE sunt
notificate mai mult de
300.000
de cazuri de infecții cu
transmitere sexuală (ITS)

În UE, în 2022 comparativ cu 2021

Gonoree 70881	+48%
Sifilis 35391	+34%
Infecție cu Chlamydia 216 508	+16%

MAJORITATEA ITS SUNT ÎNICIAL
ASIMPTOMATICE,
FAVORIZÂND TRANSMITEREA



ROMÂNIA 2022

503 cazuri noi sifilis



sifilis latent: 63,6%

sifilis secundar: 19.5%



7,6% din cazuri
au fost depistate
la gravide

TINERII SUNT AFECTAȚI ÎNTR-O MĂSURĂ MAI MARE DE ITS


Foarte mulți tineri nu știu că sunt
infecțați pentru că frecvent, nu există
simptome îngrijorătoare inițial.

**FACTORI CARE PUN TINERII LA RISC DE INFECȚII
CU TRANSMITERE SEXUALĂ**

PARTENERI MULTIPLI

SCREENING INSUFICIENT

PROBLEME DE
CONFIDENȚIALITATE



**Infecțiile cu
transmitere
sexuală pot
fi prevenite!**

Screening-ul
pentru
diagnosticarea
precoce a
persoanelor cu
ITS și a
partenerilor lor
sexuali oferă cea
mai bună
oportunitate
pentru un
tratament
eficient și pentru
prevenirea
complicațiilor și
transmiterii
ulterioare.

CARE SUNT METODELE DE PREVENIRE A INFECȚIILOR CU TRANSMITERE SEXUALĂ?

- ✓ ABSTINENȚA
- ✓ MONOGAMIA
- ✓ UTILIZAREA PREZERVATIVULUI
- ✓ TESTAREA PENTRU ITS
- ✓ VACCINAREA ÎMPOTRIVA HPV
- ✓ VACCINAREA ÎMPOTRIVA HEPATITEI B

Netratate, ITS pot
duce la consecințe
grave, inclusiv boli
neurologice și
cardiovasculare,
infertilitate, sarcină
extrauterină, nașcuți
morti și risc
crescut de infectare
cu HIV.

Pentru a preveni răspândirea infecțiilor cu transmitere sexuală se
recomandă testarea pentru ITS.



MINISTERUL
SĂNĂTĂȚII

IANUARIE 2024

CAMPANIE DE PREVENȚIE A CANCERULUI DE COL UTERIN
Informează-te! Testează-te! Vaccinează-te!



Institutul
Național de
Sănătate Publică

Anual, în lume, sunt
DIAGNOSTICATE
PESTE
600.000
cazuri.

RATA SUPRAVIEȚUIRII LA 5 ANI

DIAGNOSTIC
PRECOCE



DIAGNOSTIC
ÎN STADII AVANSATE



CINE ESTE LA RISC DE CANCER DE COL UTERIN?

Toate femeile, indiferent
de rasă/etnie sunt la risc
de a dezvolta cancer de
col uterin



CEL MAI FRECVENT SUNT
DIAGNOSTICATE FEMEI ÎN
VÂRSTĂ DE

35-44 ANI

CE CAUZEAZĂ CANCERUL DE COL UTERIN?

CEA MAI COMUNĂ CAUZĂ
HPV (HUMAN PAPILOMAVIRUS)



Peste 90% dintre cancerule
de col uterin sunt cauzate
de infecția cu HPV
Peste 80% din persoane se
infectează cu HPV în cursul
vieții, dar majoritatea nu
vor dezvolta cancer de col
uterin.

CARE SUNT SIMPTOMELE?

În mod obișnuit nu
există simptome în
stadiile precoce de
cancer de col uterin.

**ODATĂ CE CANCERUL
AVANSEAZĂ**

Simptomele pot include:

**SÂNGERĂRI VAGINALE
ANORMALE**

**SCURGERI VAGINALE
ANORMALE**

**DURERE LA CONTACTUL
SEXUAL**

DE CE ESTE SCREENING-UL CRUCIAL?

6 DIN 10
**CANCERE DE COL
UTERIN**

SUNT DEPISTATE LA
FEMEI CARE NU AU
FĂCUT NICIODATĂ UN
TEST
BABEȘ-PAPANICOLAU
sau nu au fost testate
în ultimii 5 ani.